

ЧИРОТ Е ПОЧЕСТ КАЈ ЛУЃЕ КОИ

МНОГУ СЕДАТ



Чирот или меѓу дерматолозите познат како фурункулус е длабоко воспаление на кожата, кое почнува во коренот на влакното и се шири кон површината на кожата. Се јавува како локализирано црвенило кое во почетокот е тврдо, а потоа омекнува и се издигнува над површината. Може да достигне големина на лешник. Има и силна болка. Чирот може да протече и од средината и да се цеди гнојно-крвава содржина, а тогаш се намалува болката. Предизвикувач на чирот е бактеријата *Staphylococcus aureus*.



Д-р Светлана Костиќ-Петрушевска

на горната усна или на носот. Понекогаш може да се прошири по лимфен пат и на локални лимфни јазли и да предизвика Lymphadenitis. Тоа се дефинира како инфламација и како зголемување на лимфен јазол - објаснува специјалист-дерматовенеролог Светлана Костиќ-Петрушевска во ПЗО „Д-р Светлана“ во Скопје. Furunculosis се јавува ако дојде до расејување на чирот на повеќе локации во исто време. Ако, пак, од еден воспален фоликул се прошири инфекцијата и на соседните фоликули, тогаш чирот станува многу голем и може да се цеди гној од повеќе дупчиња, и тоа се вика Carbuncle. Сите овие компликации бараат појака терапија.


НА УДАР И ОНИЕ СО НАМАЛЕН ИМУНИТЕТ

Може да се јави кај секој, но почест е кај луѓе кои седат долго време, на пример, професионални возачи, и тоа на седалната регија од телото.

- Ако често се повторува и се

Ако често се повторува и се расејува по телото, задолжително се прави лабораториско испитување на крвта да се види дали е зголемено нивото на шеќерот

расејува по телото, задолжително се прави лабораториско испитување на крвта да се види дали е зголемено нивото на шеќерот и некогаш така се открива дијабетот. На удар се и болните со намален имунитет и атопичари, односно луѓе со семејни склоности кон алергиски болести - објаснува д-р Костиќ-Петрушевска.



МОЖНА Е И МАЛА ХИРУРШКА ИНТЕРВЕНЦИЈА

Лекувањето на чирот може да биде локално и општо. Кога е локално се препишуваат антисептици, антибиотици, а кај веќе развекнатите чиреви се прави мала хируршка интервенција за побргу да се испразни чирот и за да се забрза излекувањето. Во некои случаи се даваат и системски антибиотици.

- Доколку се излекува чирот во почетната фаза, тогаш ќе помине без никаква последица на кожата, но ако коликвира, т.е. се зголеми многу, може како последица да остави хиперпигментација или вдлабната лузна на кожата - вели д-р Костиќ-Петрушевска.

А. А.



Гинеколошко-акушерска ординација

Гинекомедика

ЛАСЕРСКО ЛЕКУВАЊЕ ЕДНОКРАТНО, БЕЗБОЛНО

- РАНИЧКИ на грлото на матката (CIN - промени)
- КОНДИЛОМИ (брадавици) на генитални органи

ТРОДИМЕНЗИОНАЛНО ЕХО

- Гинеколошки прегледи
- Утврдување на бременост 5 дена по изостанок на редовен менструален циклус
- Следење на бременост
- Преглед на дојка



ПАКЕТ:

- ПАП-тест
- Видео-колпоскопија
- ЗД ЕХО преглед

1.750 ден.

Скопје | Народен фронт 9/1 | 02 3111-392; 3220-800